Pollenflugbericht - Bruneck

vom 13.07.2016

Pollenflugsituation und weitere Aussichten:

Das Pollenspektrum wird von Brennnesselgewächsen, Kiefer und Süßgräsern bestimmt. Außerdem werden Pollen von Edelkastanie, Zypressengewächsen, Wegerich, Knöterich- und Fuchsschwanzgewächsen nachgewiesen. Die feucht-warme Wetterlage begünstigt das Auftreten von Pilzsporen.

KONZENTRATIONEN IM ZEITRAUM: 04.07.2016 - 10.07.2016

Pollen

Pollentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m³	Tendenz
BRENNNESSELGEWÄCHSE								😐	46.8	↔
KIEFER								😐	45.7	↔
SÜSSGRÄSER								😐	18.9	↔
EDELKASTANIE								😟	10.3	↔
ZYPRESSENGEWÄCHSE / EIBENGEWÄCHSE								😟	9	↓
WEGERICH								☹	2.4	↔
KNÖTERICHGEWÄCHSE								😟	1.2	↔
FUCHSSCHWANZGEWÄCHSE								😟	0.2	↔

Pilzsporen

Sporentyp	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Belastung	P/m³	Tendenz
ALTERNARIA								😐	13.9	↔

Legende

Konzentration:

fehlend bis sehr gering	gering	mittel	hoch	nicht erhoben

Belastung (Wochenmittel):

☺ = fehlend bis sehr gering	😟 = gering	😐 = mittel	☹ = hoch

Tendenz:

↔ = gleich bleibend	↓ = abnehmend	↑ = steigend

P/m³:
7 Tagesmittel (Pollenkörner oder Pilzsporen pro Kubikmeter Luft)

© Biologisches Labor
Landesagentur für Umwelt
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Auszugweiser oder vollständiger Nachdruck und Veröffentlichung nur unter Angabe der Quelle gestattet